

Bloqueo caudal

(Caudal block)

¿Qué es un bloqueo caudal?

El bloqueo caudal se hace en la sala de cirugía (Operating Room, O.R. según su nombre y sigla en inglés). Es una manera para dar medicamento para el dolor a su niño una vez que se duerme.

- El medicamento disminuye la sensibilidad y el movimiento por debajo de la zona en donde se inyectó.
Un bloqueo caudal se utiliza principalmente para disminuir la sensibilidad en los pacientes que se les hace una cirugía de la cintura para abajo. Es parecido al medicamento para el dolor que se les da frecuentemente a las madres durante el trabajo de parto.
- Un anestesiólogo (el médico que ayuda a dormir a su niño para la cirugía) inyectará el medicamento para el dolor en la parte inferior de la espalda del niño.

¿Qué medicamentos se utilizan para el control caudal del dolor?

Se utilizan anestésicos locales o narcóticos.

- Casi siempre el bloqueo caudal alivia el dolor durante 4 a 6 horas.
- Su niño podría necesitar otros medicamentos para el dolor, junto con el bloqueo caudal.
- Durante unas 4 a 6 horas el niño va a sentir sus piernas dormidas. A medida que regresa la sensibilidad a sus piernas, él puede experimentar una sensación de hormigueo o picazón.

¿Existen algunos riesgos?

El médico de su niño hablará con usted acerca de los riesgos y los efectos secundarios que se pueden observar con el bloqueo caudal. El niño podría presentar uno o más de tales efectos. Algunos de los riesgos y efectos secundarios más frecuentes son:

- Disminución de la sensibilidad por debajo del sitio de la inyección –
- Se pueden sentir las piernas flojas o tambaleantes por algunas horas.

¿Cómo debo cuidar a mi niño en la casa?

- Después del bloqueo caudal, y por lo menos durante 4 horas, no le permita a su niño caminar o gatear sin ayuda. Puede que sienta sus piernas dormidas y tambaleantes, y esto le podría ocasionar caídas.
- Mantenga las piernas de su niño fuera del alcance de objetos fríos o calientes. Es posible que no pueda sentirlos y ellos le podrían causar quemaduras o congelación.
- Siga todas las instrucciones o los tratamientos ordenados por su cirujano o por su médico.

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

Bloqueo caudal, continuación

¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame **inmediatamente** al cirujano de su niño si no ha orinado en las 6 horas siguientes de haber salido del hospital.

También llame si usted tiene preguntas o preocupaciones acerca de cómo se ve o se siente su niño.

Esta hoja educativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su niño o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.