Fluoroscopia *(Fluoroscopy)*
Preparación para el procedimiento

Busque en la parte de abajo, el examen que se le hará a su niño. Luego, siga las recomendaciones para prepararlo para ese examen. Algunas de las recomendaciones varían según la edad. Asegúrese de que las recomendaciones sean las correctas para la edad de su niño.
Si usted no sigue las recomendaciones, tendremos que volver a programar la cita de su niño.

Enema de bario *(Barium enema)* para el estreñimiento
Para todas las edades—No aplicar nada por el recto, como enemas o supositorios, el día antes del examen.

Enema de bario *(Barium enema)*
Hasta los 2 años de edad

- 12 horas antes del examen—No dar comidas sólidas. Se pueden dar líquidos.
- Tres horas antes del examen—No comer ni beber.

2 años de edad y mayores

- Un día antes del examen— Únicamente líquidos transparentes, como caldo transparente, agua y gelatina *(Jell-O)* sin frutas.
- A las 4 p.m. del día anterior al examen—Dé Senokot para niños por vía oral *(boca).* El Senokot se encuentra prácticamente en todas las farmacias.
  - 1 cucharadita por cada 10 libras de peso corporal del niño. Ejemplo: Su niño pesa 80 libras, dele 8 cucharaditas de Senokot.
- La noche anterior al examen, al momento de acostarse, y nuevamente temprano en la mañana del examen—Póngale un enema Fleet (para niños o adultos). Los enemas Fleet pueden encontrarse prácticamente en todas las farmacias.
  - Edad 2 a 11 años—Use un enema Fleet para niños.
  - Edad 12 años y mayores—Use un enema Fleet para adultos.
- Tres horas antes del examen—Nada de comer ni beber.

Tránsito gastrointestinal superior (Upper GI)/ Tránsito gastrointestinal superior con intestino delgado *(upper GI with small bowel follow thru)* o Esofagograma *(Esophagram)*
Hasta 1 año de edad

- Tres horas antes del examen, nada por vía oral *(boca)*– ni siquiera líquidos transparentes

Edad 13 meses a 2 años

- Seis horas antes del examen, únicamente líquidos transparentes
- Cuatro horas antes del examen, nada por vía oral *(boca* – ni siquiera líquidos transparentes

Edad 25 meses a 4 años

- Seis horas antes del examen, nada por vía oral *(boca* – ni siquiera líquidos transparentes

Edad 5 a 12 años

- Ocho horas antes del examen, nada por vía oral *(boca* – ni siquiera líquidos transparentes

Edad 13 años y mayores

- No comer alimentos sólidos después de la medianoche del día del examen (únicamente líquidos transparentes)
- Ocho horas antes del examen, nada por vía oral *(boca* – ni siquiera líquidos transparentes

Examen de la sonda G *(G-tube)* -tubo para alimentación
Para todas las edades—No hay recomendaciones

Nefrostograma/ cistograma *(Nephrostogram/cystogram)*
Para todas las edades—No hay recomendaciones

Estudio de la motilidad orofaríngea (deglución) *(Oral pharyngeal motility study -OPMS)*
Los Servicios de Rehabilitación le darán las instrucciones para este examen.

Estudio de urodinamia *(Urodynamic study)*
Este examen es programado por el urólogo quien le dará las recomendaciones especiales.

Cistouretrograma miccional *(Voiding cystourethrogram -VCUG)*
Para todas las edades—No hay recomendaciones