

# Dosis de prueba de baclofeno en bolo

## (Baclofen bolus test dose)

---



### ¿Por qué mi hijo necesita una dosis de prueba de baclofeno?

La dosis de prueba de baclofeno le ayudará al médico a decidir si una bomba intratecal de baclofeno puede servirle a su hijo. Si la rigidez muscular disminuye después de la dosis de prueba, es posible que obtenga la bomba.

### ¿Cómo será la dosis de prueba?

- La dosis de prueba puede hacerse en Radiología o en una sala de procedimientos. Esto depende de las necesidades de su hijo y de lo que el médico prefiera.
- Es posible que su hijo pase la noche en el hospital. Esto también depende de las necesidades de su hijo y de lo que el médico prefiera.
- Para la dosis de prueba, un integrante del equipo de atención de su hijo hará lo siguiente:
  - Aplicará crema anestésica en la espalda de su hijo. Esto ayuda a disminuir el dolor en el sitio donde la aguja penetra en la piel.
  - Usará una jeringa y una aguja pequeñas para administrar una pequeña dosis de baclofeno en el líquido cefalorraquídeo de su hijo. El líquido se encuentra en el espacio que rodea la médula espinal, en la zona baja de la espalda de su hijo.
  - Quitará la aguja y colocará un vendaje.
  - Tomará los signos vitales de su hijo (frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración y nivel de oxígeno).

### ¿Qué sucederá después de la dosis de prueba?

Procure que su hijo esté seguro después de la prueba:

- Haga que permanezca en la cama hasta que lo examine un miembro del equipo de atención médica.
- Mantenga las barandas de la cama elevadas. Pida ayuda al personal si necesita sacarlo de la cama.

El médico o el fisioterapeuta de su hijo examinarán sus músculos para verificar su rigidez (espasticidad).

- Su hijo podrá tener dificultad para pararse o caminar si tiene los músculos muy flojos.
- Los músculos de su hijo pueden relajarse solo un poco o tanto que no pueda usarlos. Esta relajación es solo temporal.
- Pasadas las 6-8 horas, la rigidez muscular de su hijo regresará a su nivel anterior (antes de recibir la dosis de prueba).

Debido a la dosis de prueba, su hijo podrá presentar de forma temporaria 1 o más de los siguientes síntomas:

- Náuseas o vómitos

**En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.**

## Dosis de prueba de baclofeno en bolo, continuación

---

- Somnolencia
- Músculos demasiado flojos/relajados
- Dolores de cabeza
- Mareo

Si su hijo presenta cualquiera de estos síntomas, informe **de inmediato** al personal de enfermería.

### ¿Cuándo recibiré los resultados de la dosis de prueba?

- La dosis de prueba es solo una prueba de valoración. Servirá para saber si el medicamento puede disminuir la rigidez muscular y los espasmos de su hijo.
- El médico quizá le diga si el medicamento puede ser efectivo o no antes de ir a casa.
- Algunos niños no responden a la primera dosis de prueba. El médico le podrá dar una segunda dosis más alta otro día.

### ¿Cuándo debo llamar al médico?

Al regresar a casa llame al médico si su hijo tiene lo siguiente:

- Náuseas o vómitos
- Enrojecimiento, hinchazón, pus, supuración o mal olor en el lugar donde se inyectó la dosis de prueba
- Fiebre mayor de 101°F que no se alivia con paracetamol (Tylenol u otra marca más económica)
- Problemas para mantenerse despierto
- Sarpullido o picazón nuevos
- Dolor de cabeza intenso (muy fuerte)

### ¿Qué necesito saber si mi hijo recibe una bomba intratecal de baclofeno?

- La mayoría de las veces la bomba de baclofeno se recarga durante una consulta.
- Para asegurarse de que la bomba funcione lo mejor posible y evitar problemas, usted DEBE:
  - Saber la fecha de la próxima recarga.
  - Llevar siempre a su hijo a sus citas de control.
- Usted DEBE saber cuáles son los síntomas por exceso de baclofeno (sobredosis) o por falta de baclofeno (dosis insuficiente). Ambos pueden causar serios problemas y enfermar a su hijo de gravedad.
- Usted DEBE reaccionar y solicitar atención médica **de inmediato**, si observa alguno de los siguientes síntomas.

#### Síntomas **de exceso** de baclofeno (sobredosis):

- Debilidad muscular

En caso de emergencia o si tiene una inquietud urgente, llame al 911 o vaya inmediatamente a la sala de urgencias más cercana.

## Dosis de prueba de baclofeno en bolo, continuación

---

- Exceso de sueño y dificultad para mantenerse despierto
- Sensación de mareo
- Aturdimiento
- Convulsiones
- Dificultad para respirar
- Coma

### Síntomas de falta de baclofeno (dosis insuficiente):

- Sarpullido o picazón sin sarpullido
- Aumento o agravamiento de la rigidez muscular
- Fiebre mayor de 101°F
- Alteración del estado mental (por ejemplo, está nervioso, confundido, menos alerta o tiene reacciones lentas).

**Llame de inmediato al médico de su hijo o vaya a la sala de urgencias (ED, en inglés) más cercana si su hijo presenta cualquiera de los síntomas que se indican arriba.**

- Lleve consigo su *Emergency Baclofen Card* (Tarjeta de Urgencia de Baclofeno) y la *Implanted Device Card* (Tarjeta del Dispositivo Implantado).
- Al llegar, **informe enseguida** al personal que su hijo tiene una bomba intratecal.

**Esta hoja informativa contiene sólo información general. Hable con el médico de su hijo o con uno de los integrantes de su equipo de atención médica sobre el cuidado específico para él.**